

TÁJÉKOZTATÓ

COVID-19 Vaccine AstraZeneca oltás beadásához

INTÉZMÉNY NEVE: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ TAGINTÉZMÉNYEI

Oltandó neve:	Születési dátum:
TAJ szám:	Lakcím:
Telefonszám:	email cím:

Tájékoztatjuk, hogy Ön az **AstraZeneca COVID 19 elleni vakcinát kapja**, mely elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a koronavírus fertőzés ellen. A COVID-19 Vaccine AstraZeneca úgynevezett monovalens vakcina, amely a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéjét kódoló, szaporodásra képtelen adenovírust tartalmaz.

Az oltást **izomba kell beadni**, lehetőleg a felkar deltaizmába. A COVID-19 Vaccine AstraZeneca-val történő oltási sorozatban két különálló, egyenként 0,5 ml-es adagot kell beadni. **A második adagot 4-12 héttel (28-84 nappal) az első adagot követően kell alkalmazni.**

Figyelmeztetések, ellenjavallatok, javaslatok

- 1. A védettség a COVID-19 Vaccine AstraZeneca első dózist követően körülbelül 3 héttel alakul ki. Lehetséges, hogy a második adag beadását követő 15 napig a védettség nem teljes.** Mint minden vakcinánál, a COVID-19 Vaccine AstraZeneca-val történő oltás esetében is **előfordulhat, hogy az nem biztosít védelmet** minden beoltott személy számára. **Ezért az oltás után is be kell tartani az általános járványügyi biztonsági előírásokat (pl. maszk viselése).**
- 2. Immunrendszer működését gátló kezelésben részesülők** (daganatos kezelés, transzplantáció, egyéb okból immuran, steroid kezelés stb), valamint autoimmun betegségben szenvedők esetén **az oltás kevésbé lehet hatékony a fertőzéssel szembeni védelem terén, de beadása nem kontraindikált.**
3. Alvadási zavar, vagy alvadásgátló kezelés mellett az oltás fokozott óvatossággal adható, de nem ellenjavallt.
- 4. Jelenleg a várandós vagy szoptató nőknek, illetve a 18 évnél fiatalabb gyermekeknek és serdülőknek az oltás nem javasolt**
- 5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők a második oltás után legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet.**

- 6. Magas lázzal járó betegségben, súlyos fertőzés esetén az oltás beadása kontraindikált.** Enyhe hőemelkedés, megfázásos panaszok mellett az oltás beadható.
7. Azon személyek, **akiknek kórtörténetében ismeretlen eredetű, azonnali anafilaxiás reakció szerepel, nem kaphatják meg a védőoltást.** A vakcina második adagját nem szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak az első oltás alkalmazása során.

Lehetséges oltási reakciók, mellékhatások, szövődmények

A védőoltás beadása után oltási reakciók fordulhatnak elő. Ezek közül a leggyakoribbak: fájdalom a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.

Ezek általában enyhék vagy közepesen súlyosak és a vakcina beadása után pár napon belül elmúlnak.

A legsúlyosabb, de nagyon ritka következmény a heveny súlyos allergiás reakció, anafilaxiás sokk, melynek bevezető tünetei lehetnek: torokduzzanat, bőrpír, kiterjedt bőrviszketés, csalánszerű kiütések, szédülés, fulladás, arc, szem, egyéb testtájak hevenyen fellépő duzzanata. Ezek a beadást követően néhány percen belül lépnek fel, ezért kérjük, hogy az oltás után legalább 15 perc várakozási időt feltétlenül töltsön el az oltóhelyen, és azonnal jelezze az oltásban résztvevő személyeknek a panaszát.

A fenti tájékoztatást elolvastam, önként, befolyástól mentesen hozzájárulok a COVID 19 elleni vakcina beadásához, **amennyiben a fentiek és a később kitöltésre kerülő kérdőív alapján kontraindikációja nincs.**

Az oltóhely, mint egészségügyi szolgáltató, és az NNK által kiadott adatkezelési tájékoztatókat megismertem.

Hozzájárulok személyes és egészségügyi adataim járványügyi célból történő kezeléséhez a kórház, a Nemzeti telefonos egészségügyi szolgálat valamint az NNK által.

Hozzájárulok, hogy az oltóhely illetve a Nemzeti telefonos egészségügyi szolgálat az oltással kapcsolatban részemre SMS-t, e-mail üzenetet küldjön, vagy telefonon keressen.

Az oltást követően, esetenként allergiás reakció léphet fel, ezért 15 percig még a helyszínen tartózkodom. **Ha ez idő előtt távozom, az saját felelősségemre történik.**

Dátum:.....

.....
Oltott személy, vagy gondnoka aláírása